

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects medical documents written by Algerian assistant professors, professors or any other health practicals and teachers from the same field.

Some articles are subject to the author's copyrights.


Our team does not own copyrights for the most content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to be in contact with all authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: facadm16@gmail.com to settle the situation.

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.




Elle coïncide avec pr morphismog n se au cours de laquelle 3 ph nom nes se d roulent :

- F condation :
- segmentation :
- formation de blastocyste :

Segmentation

Formation du blastocyste



F condation

FECONDATION

Lieu : La f condation a lieu dans le tiers externe de la trompe de Fallope.

M canisme : p n tration du contenu du spz (n) dans l'ovocyte II (n) pour former un zygote (2n)

Trajet des spermatozo ides

3 ml de sperme sont d pos s dans la cavit  vaginale.

Les spermatozo ides sont attir s vers le col ut rin.

Les spermatozo ides remontent le long de l'endom tre contract  et l' pith lium cili  de la trompe de Fallope.

Les spermatozo ides atteignent enfin le tiers externe de la trompe de Fallope.

D p t de 300 millions de spermatozo ides dans la cavit  vaginale.

Elimination des spermatozo ides par le Ph acide du vagin.

Elimination des spermatozo ides par la glaire cervicale.

Passage de 2 millions de spermatozo ides dans la cavit  ut rine.

Elimination des spermatozo ides par phagocytose au cours du transit ut ro-tubaire.

Arriv e d'une dizaine de spermatozo ides autour de l'ovocyte II B M II.

Dur e du trajet des spermatozo ides : de la cavit  vaginale jusqu'au tiers externe de la trompe de Fallope, la dur e du trajet des spermatozo ides est de 30 minutes en moyenne.

P riode de f condabilit 


Capacitation des spermatozo ides : acquisition du pouvoir f condant dans le canal  pididymaire.

D capacitation des spermatozo ides : fixation des prot ines inhibitrices sur la membrane plasmique des spermatozo ides et la membrane externe de l'acrosome dans le canal  pididymaire.

Durée de vie : - des spermatozoïdes : 48 heures
- de l'ovocyte II B M II : 24 heures.

S'il n'est pas fécondé dans les 24 heures qui suivent son ovulation l'ovocyte II B M II dégénère.

Rencontre des deux gamètes




Recapacitation des spermatozoïdes : Pour que la fécondation soit possible le spermatozoïde doit être recapacité. Elle a lieu dans l'appareil génital de la femme, au contact des cellules du cumulus oophorus. Les protéines inhibitrices sont détruites.

Vesiculisation

C'est la fusion de la membrane plasmique du spermatozoïde avec la membrane externe de l'acrosome. Elle permet la libération des enzymes hydrolases.

Réaction acrosomiale : la vesiculisation provoque la libération des enzymes.



Libération des enzymes : l'acrosome libère 3 types d'enzymes qui interviennent dans la fécondation.

Hyaluronidase : elle détruit le ciment intercellulaire du cumulus oosphorus et de la corona radiata.


C.P.E : elle hydrolyse les cellules de la corona radiata.

Acrosine : elle détruit la zone pellucide.

Localisation du spermatozoïde : il se place tangentielle à la surface de l'ovocyte II B M II.

Plasmogamie : fusion des membranes plasmiques de l'ovocyte II et du spermatozoïde.

La totalité du spermatozoïde pénètre dans l'ovocyte II à l'exception de la membrane plasmique.



Conséquences de la fécondation





Blocage de la polyspermie.

Par exocytose, les granules corticaux, autour de la membrane plasmique de l'ovocyte II B M II, libèrent leurs produits de sécrétion pour former une membrane de fécondation, entre la membrane plasmique et la zone pellucide, imperméable aux autres spermatozoïdes.

Réveil des enzymes cytoplasmiques de l'ovule.

Décondensation de l'ADN du spermatozoïde.

Achèvement de la méiose II qui donne l'ovule et le 2° globule polaire.



Formation du zygote

Amphimixie : union des 2 pronuclei mâle et femelle qui donne le noyau du zygote.

SEGMENTATION

Le zygote se segmente en même temps qu'il se déplace le long de la trompe de Fallope (MIGRATION TUBAIRE) en se dirigeant vers la cavité utérine.

CHRONOLOGIE DE LA SEGMENTATION

Stade 2 blastomères obtenus entre 24 à 30 h après la fécondation.

Stade 3 blastomères obtenu entre 30 à 36 h (par la division du plus grand blastomère.)

Stade 4 blastomères est obtenu entre 36 à 40 h après la fécondation.

Stade 8 blastomères est obtenu entre 40 à 50 h après la fécondation.

Stade morula (16 à 30 blastomères) obtenu entre le 3^e et le 4^e j du D E.

La taille des blastomères est plus ou moins égale, mais au stade morula, les blastomères périphériques sont légèrement plus petits (micromeres) que les blastomères centraux (macromeres).


Caractères de la segmentation :

- Totale (le zygote se divise entièrement).
- Inégale (stade de 2 blastomères inégaux).
- Asynchrone (stade de 3 blastomères).

synchrone = par paire.

Le 5^e jour du développement embryonnaire, la morula se creuse d'une **cavité blastocystique**, remplie de liquide, dans la cavité utérine. On distingue deux groupes de cellules :

- petites cellules aplaties : **trophoblaste**, elles dérivent des micromeres
- grandes cellules polyédriques ou sphériques : **bouton embryonnaire**, elles dérivent des macromeres



Structure du blastocyste

Remarque :

Les cellules qui se divisent rapidement possèdent le même patrimoine génétique.

Les blastomères sont totipotents (très large pouvoir de différenciation) jusqu'au stade de 10 cellules environ. Cela signifie que chacune d'entre elles prise isolément peut reprendre sa division et fournir un embryon complet.

